




## Pády hospitalizovaných pacientov – vyhodnotenie za rok 2016

V súčasnej dobe venujú zdravotnícke zariadenia zvýšenú pozornosť prostrediu, v ktorom poskytujú zdravotnú starostlivosť. V organizáciách, ktoré si uvedomili priaznivý vplyv zdravej a otvorenej kultúry na zlepšovanie zdravotnej starostlivosti sa termín „kultúra bezpečia“ stala módnym pojmom. Atmosféra vzájomnej dôvery, v ktorej personál môže voľne hovoriť o otázkach bezpečia a ich riešenia bez strachu z následkov, je dnes považovaná ako základ k zlepšeniu v akejkoľvek organizácii.

Problematika pádov je jedným zo základných záujmov, ktoré organizácie pri pokusoch o zlepšenie vnútornej kultúry musia vziať do úvahy. Podľa štatistík sú pády najvýznamnejšou mimoriadnou udalosťou v nemocniciach. Vedľa zrejmych, na mieste vzniknutých úrazov z pádov, pôsobia pády tiež dlhodobo na pohyblivosť, fyzické a duševné zdravie, sebaistoť a kvalitu života pacientov. V mnohých prípadoch môžu pády predĺžiť hospitalizáciu a zvýšiť riziko ďalších pádov.

Ako príklad je možné uviesť, že v USA sa pády podieľajú najväčšou mierou na traumatologických hospitalizáciách a sú etiologickým faktorom smrti spôsobenej úrazom u obyvateľov nad 65 rokov veku. Počet pádov pacientov s pribúdajúcim vekom stúpa u oboch pohlaví. Najvyšší počet pádov rezultujúcich do zranení je u osôb nad 85 rokov veku. Pády sú tiež častou príčinou morbidít. Vyskytujú sa pri všetkých kategóriách pacientov, avšak pády v starších vekových kategóriách spôsobujú závažnejšie poranenia. Najstarší občania USA, ktorí reprezentujú 12% populácie, sa podieľajú na úmrtnosti spôsobenej pádmi 75%.

Pre lepšie pochopenie príčiny pádov založili mnohé zdravotnícke zariadenia pri hľadaní parametrov uznávanej definície pádov svoju klasifikáciu, ktorá je založená na faktoroch fyziologických a na faktoroch prostredia. V našom zdravotníckom zariadení máme zavedený pracovný postup „Prevencia a opatrenia proti pádom na lôžkových oddeleniach FNŠP FDR“. Pri prijatí pacienta sú v zmysle uvedeného pracovného postupu posúdené riziká pádu a pacient je počas hospitalizácie náležite monitorovaný personálom. Napriek tomu však vznikajú v nemocnici situácie, kedy pádom nie je možné predísť.




Pády hospitalizovaných pacientov – obdobie: rok 2016					
Katégorie	I. kategória Bez poranenia	II. kategória Vyžadujúce dodatočnú diagnostiku	III. kategória Vyžaduje liečbu a predlžuje hospitalizáciu	IV. kategória Vyžaduje operáciu, preklad podľa typu poranenia	Celkom
Miesto vzniku					
Pád na izbe	28	25	2	2	57
Pád na chodbe	9	3	1	2	15
Pád v sprche, WC	5	2	1	1	9
Pád mimo oddelenia					
<b>Celkom</b>	<b>42</b>	<b>30</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>81</b>

Náklady na pacientov postihnutých pádmi	Nezvýšené	Zvýšené	Celkom
Počet	42	39	81

Vek pacientov s pádom	Menej ako 70 rokov	Viac ako 70 rokov	Celkom
Počet	26	55	81

Miesto a príčina pádov	Počet
Ublíženie pacienta (úder dverami, zakopnutie)	15
Pád pri záchvate	3
Pacient stojaci (náhla slabosť)	16
Pád z postele	34
Pád v kúpeľni	6
Pád na toalete (WC)	7
<b>Celkom</b>	<b>81</b>

Vypracoval: Renáta Polakovičová, 16.02.2017

  
MUDr. Peter Molnár, MBA  
Zmocnenec pre kvalitu