
HNAČKA

- pasáž ≥ 3 neformovaných stolíc za deň
- pasáž 250 g neformovanej stolice za deň



Herbert L. Acute Infectious Diarrhea in Immunocompetent Adults. N Engl Med 2014; 370: 1532- 40.

HODNOTENIE A LIEČBA

KOLITÍDA PRÍTOMNÁ
(pasáž malého množstva stolice s prímesou krvi +/- prímes hlienu, tenezmus)

↓

KULTIVÁCIA STOLICE
Shigella, Salmonela, Campylobacter,
Shiga toxin prod. E.Coli
Ak ↑ teplota - hemokultúra
Ak pacient imunokopro-mitovaný hľadaj črevných patogénov v stolici

↓

LIEČBA podľa výsledku, ak indikácia

TEPLOTA ≥ 38,5°C

Obmedzu-júce ochorenie; trvanie ≥ 48 h

Stabilný stav a zlepšujúci sa

Nie sú potrebné žiadne diagnostické vyšetrenia
Ak žiadne zlepšenie, Liečba ako hnačky trvajúcej ≥ 48 h

Expozícia NEMOCNICI, HOSPICU, ATB

-Mierna/stredne ťažká hnačka
-Bez zápalovej odpovede WBC□15 x10^9/l, bez ↑ teploty
-Bez orgánového zlyhania
-Pacient nie je starší alebo naJIS

↓

Tekutiny, elektrolyty
Ak sa stav zhorší, liečba ako pacientov s ≥6 stolicami/deň

Ťažká hnačka
Pasáž ≥6 stolíc/deň
Hnačka ≥72h
Zápalová odpoveď WBC□15 x10^9/l
Teplota
Príme krvi
↓diuréza
Orgánove zlyhanie
S Albumín□2.5g/dl
Pacient na JIS

↓

Dôkaz toxínov Clostridium Difficile v stolici

Liečba CDAD, závisí od závažnosti a či ide o prvý atak alebo rekurenciu

Zvážiť colectómiu pri vysokých teplotách, fulminantnom priebehu alebo megacolon

PERZISTENTNÁ HNAČKA

↓

Kultivácia stolice.
Pátranie po parazitoch
Ak pacient imunokopro-mitovaný, hľadaj vybraných patogénov v stolici

↓

LIEČBA podľa výsledku, ak indikácia

CDAD Clostridium difficile asociated diarrhea

Herbert L. Acute Infectious Diarrhea in Immunocompetent Adults. N Engl Med 2014; 370: 1532- 40.