Manažment dyslipidémie u pacientov s CKD

KDIGO odporúčania

2013

Farmakologická liečba na zníženie cholesterolu u pacientov s CKD

- **U nedialyzovaných pacientov vo veku ≥ 50 rokov**

  - s eGFR < 60 ml/min/1.73 m2 (CKD štádiá 3a-5) sa odporúča statín alebo kombinácia statín a ezetimib

  - s eGFR ≥ 60 ml/min/1.73 m2 (CKD štádiá 1-2) sa odporúča statín

- **U nedialyzovaných pacientov vo veku 18-49 rokov sa navrhuje** liečba statínom pri súčasnej prítomnosti :

  - koronárneho ochorenia (stp. IM alebo revaskularizácii)

  - diabetes mellitus

  - stp. ischemickej CMP

  - odhadovaná 10-ročná incidencia koronárneho úmrtia nebo nefatálneho IM 10%

Farmakologická liečba na zníženie cholesterolu u pacientov s CKD

- U dospelých pacientov s CKD už liečených dialýzou sa **navrhuje** nezahajovať liečbu statínom alebo kombináciou statín/ezetimib

- U pacientov už liečených statínom alebo kombináciou statín/ezetimib sa **navrhuje** pri zahájení dialyzačnej liečby pokračovať v podávaní týchto liekov

- U dospelých príjemcov transplantovanej obličky sa **navrhuje** liečba statínom

Dávkovanie statínov u pacientov s CKD

KDIGO 2013

Table 4 | Recommended doses (mg/d) of statins in adults with CKD

Statin	eGFR G1-G2	eGFR G3a-G5, including patients on dialysis or with a kidney transplant
Lovastatin	GP	nd
Fluvastatin	GP	80[1]
Atorvastatin	GP	20[2]
Rosuvastatin	GP	10[3]
Simvastatin/Ezetmibe	GP	20/10[4]
Pravastatin	GP	40
Simvastatin	GP	40
Pitavastatin	GP	2

Farmakologická liečba na zníženie triglyceridov u pacientov s CKD

- U dospelých pacientov s CKD (vrátane liečených chronickou dialýzou alebo transplantáciou obličky) a hypertriglyceridémiou sa **navrhuje** nefarmakologická liečba – redukcia hmotnosti, obmedziť alkohol, liečba hyperglykémie, zvýšenie fyzickej aktivity